


Rivaroxaban WH

(10, 15 og 20 mg rivaroxaban)



Pakningastærðir: 10 mg 98 stk, 15 mg 28 stk og 98 stk, 20 mg 28 stk og 98 stk

Verkunarmáti





✓ Atrial Fibrillation

- Poor blood circulation
- Can lead to Blood clot



✓ DVT

- Deep vein thrombosis
- Prophylaxis
- Treatment



✓ PE

- Pulmonary Embolism
- Prophylaxis
- Treatment



✓ After Surgery

- Knee replacement
- Hip replacement



Skammtar

- 10 mg
 - Fyrirbyggjandi meðferð gegn bláæðasegareki í kjölfar aðgerða
- 15 mg
 - 1 tafla 2svar á dag:
Upphafsméðferð við segamyndun í djúplægum æðum, meðferð við segareki í lungum
- 20 mg
 - Framhaldsméðferð við segamyndun í djúplægum æðum, meðferð við segareki í lungum og fyrirbyggjandi við endurteknu segareki

Lyfjagjöf

- Til inntöku
 - 10 mg má taka með eða án fæðu
 - 15 og 20 mg **skal** taka með fæðu
- Greiðsluþátttaka:
 - Almenn greiðsluþátttaka (G)

Frábendingar

- × Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnum.
- × Virk blæðing sem hefur klínísku þýðingu.
- × Áverki eða ástand þar sem talið er að hætta geti verið á mikilli blæðingu. Sjá dæmi í SmPC.
- × Samhliða meðferð með öðrum segavarnarlyfjum sem talin eru upp í eiginleikalýsingunni, nema við þær sérstöku aðstæður að verið sé að skipta um blóðþynningarmeðferð eða ef ósundurgreint heparin er gefið í skömmtum sem duga til að viðhalda opnum æðalegg í miðlægri bláæð eða slagæð.
- × Lifrarsjúkdómur með blóðstorkutruflunum og blæðingarhættu sem hefur klínísku þýðingu, þar með talið hjá sjúklingum með skorpulífur af flokki Child Pugh B og C.
- × Meðganga og brjóstgjöf.

